

新型コロナウイルスワクチン接種後

副反応について

新型コロナワクチンは、発症予防効果や重症化予防効果を期待して接種します。ワクチンの接種後、特に2回目の接種後は、多くの人に発熱・頭痛・倦怠感などの全身性副反応が起こります。これは、ワクチンに対する免疫反応のひとつで、数日で軽快します。主な副反応は以下の通りです。



解熱鎮痛剤について

「ワクチンの効果が低下するのでは」と解熱鎮痛剤の使用に不安を持つ方がいるようですが、厚生労働省は解熱鎮痛剤は使用して良いとしています。アスピリン・ロキソプロフェン・イブプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)ではなく、抗炎症作用の少ないアセトアミノフェン(カロナールやタイレノール)を服用した方が良いという考えもあるようです。また、アメリカ疾病対策センター(CDC)はNSAIDsを含む解熱鎮痛剤を使用して良いとしています。



「ワクチンを受けた後に熱が出たらどうすれば良いですか？」
 など新型コロナワクチンの情報が厚生労働省(mhlw.go.jp)に掲載されていますので参考にご覧ください。

国立病院機構三重病院が開発した
 ワクチンの安全性情報をリアルタイムで収集できる
 安全性調査SNSアプリ
 「COV-Safe」
 こちらも活用してみてください。



新型コロナワクチンを接種する方で 血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

飲んでいる薬によっては、出血すると止まりにくいことがあるので、
予診票で薬の種類をおたずねしています。

ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。

接種(筋肉注射)にあたっての注意点

★接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

- ・腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
- ・接種にあたって、薬の休薬は必要ありません。



対象の お薬

抗凝固薬

不整脈・血栓症・心臓の手術後の方に処方されることが多い薬

商品名	一般名	商品名	一般名
ワーファリン	ワルファリンカリウム	プラザキサ	ダビガトランエテキシラート
イグザレルト	リバーロキサバン	エリキュース	アピキサバン
リクシアナ	エドキサバントシル酸塩水和物		

血をサラサラにする薬は、次のような薬もありますが、通常どおり接種を受けていただけます。

抗血小板薬

動脈硬化・狭心症・心筋梗塞・脳梗塞後、下肢動脈閉塞症
などの方に処方されることが多い薬

商品名	一般名	商品名	一般名
バイアスピリン	アスピリン	ブリリント	チカグレロル
パナルジン	チクロピジン塩酸塩	コンプラビン配合錠	アスピリン・クロピドグレル硫酸塩
プラビックス	クロピドグレル塩酸塩	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール
エフィエント	プラスグレレル塩酸塩	エパデール	イコサペント酸エチル(EPA)
プレタール	シロスタゾール	ドルナー、プロサイリン	ベラプロストナトリウム
バファリン	アスピリン・ゲイアルミネート配合剤	アンプラーグ	サルボグレラート塩酸塩

お困りのことや不安なことなどは当薬局にご相談ください。



ほほえみ柳山薬局
TEL 059-213-3555